




Liliáceas

• Puerro | *Allium porrum***Familia**

Liliáceas

Varietades

...

Época de cultivo

Desde febrero a septiembre.

Duración del ciclo

De cinco a seis meses.

Tipo de planta

Bianual

Necesidades**Sol****Agua****Abono****Siembra y cuidados**

Es más recomendable hacer semilleros y posteriormente trasplantarlos por lo menos en los meses más fríos. Les conviene que los aporquen [poner tierra alrededor de la planta], esto favorece el blanqueado del tallo, que es lo que comemos. Toleran mal las altas temperaturas y necesitan tierra rica en nutrientes. Al trasplantarlos, igual que a las cebollas, es bueno cortarles un poco las hojas para favorecer el enraizamiento.

Distancia de plantación [Fila X planta en cm]

25~30 X 6~10 cm.

Cosecha

Se arrancan enteros y pueden cosecharse antes de su máximo desarrollo.

Asociaciones favorables

Apio, berenjena, cebolla, col, escarola, espinaca, lechuga, patata, pimiento, remolacha, tomate y zanahoria.

Asociaciones desfavorables

...

Enfermedades y plagas

Es atacada por la oruga de la mariposa del puerro que producen galerías en las hojas y el tallo. La planta de zanahoria repele a la mariposa del puerro y el puerro repele a la mosca de la zanahoria por eso suelen combinarse en asociación.

Para obtener semillas

Al igual que la cebolla, debemos dejar que se seque la flor [Inflorescencia: Formada por muchas flores pequeñas] para poder sacar las semillas. Un truco para separar las semillas de la flor seca es meterlas en bolsas y sacudirlas/aplastarlas con las manos.