

**Crucíferas** [Brasicáceas]

## • Repollo | *Brassica oleracea*

**Familia**

Crucíferas

**Varietades**

...

**Época de cultivo**

Otoño • Invierno

**Duración del ciclo**

Entre tres y cinco meses.

**Tipo de planta**

Anual

**Necesidades****Sol****Agua****Abono****Siembra y cuidados**

Hay que hacer semilleros protegidos en invierno [enero-febrero] y al aire libre en las demás estaciones. Es recomendable planificar la huerta de tal manera que haya espacio para poner los repollos y lombardas a finales de verano y que tengan tiempo suficiente para desarrollarse antes de que llegue el frío y puedan cogollar. Prefieren suelos profundos y bien abonados a los que no les falta humedad.

**Distancia de plantación** [Fila X planta en cm]

50~70 X 40~60 cm.

**Cosecha**

Se arrancan enteros cortando la planta con un cuchillo a ras del suelo o arrancándola de raíz.

**Asociaciones favorables**

Apio, berenjena, calabaza, escarola, espinaca, guisante, judía, lechuga, patata, pepino, pimiento, puerro, remolacha y tomate.

**Asociaciones desfavorables**

Ajo, cebolla y fresa.

**Enfermedades y plagas**

La mariposa de la col, los insectos minadores y los pulgones son las principales plagas de las coles. La mariposa de la col [blanca] pone los huevos de color amarillo por debajo de las hojas. Las orugas que se desarrollan son muy voraces y se alimentan de las hojas dejando únicamente los nervios foliares. Los insectos minadores se pueden observar fácilmente gracias a las galerías que hacen en sus hojas

**Para obtener semillas**

Hay que dejar el cogollo en el bancal hasta que suba a flor cuando aumenten las temperaturas. Saldrá un tallo central del que saldrán muchas florecitas pequeñas. En ocasiones estos tallos llenos de flores pesan demasiado y empiezan a tumbarse, en ese caso es recomendable entutorarlas para que la planta no llegue a morir y tenga tiempo suficiente para madurar las semillas. Después solo hay que esperar a que las vainas se sequen para poder sacar las semillas.