



Umbelíferas

• Zanahoria | *Daucus carota***Familia**

Umbelíferas

Varietades

Redondas y cilíndricas.

Época de cultivo

Prácticamente todo el año, salvo en los meses muy fríos.

Duración del ciclo

De cuatro a seis meses.

Tipo de planta

Bianual

Necesidades**Sol****Agua****Abono****Siembra y cuidados**

Siembra directa a voleo o chorrillo. Tardan mucho en germinar por lo que podemos dejarlas en remojo un día antes de la siembra. Si sembramos en hilera y la mayoría germinan, después tenemos que clarear dejando unos 8 a 10 centímetros entre plantas. Al igual que los rabanitos, conviene mezclar estas semillas con arena fina, para reducir la pérdida de semillas. No conviene enterrarlas mucho y el suelo deberá permanecer húmedo al principio de la germinación. Necesitan suelos muy sueltos, tirando a arenosos para desarrollarse bien.

Distancia de plantación [Fila X planta en cm]

10~20 X 510 cm.

Cosecha

La zanahoria es un cultivo lento. Se sacan enteras de la tierra cuando ya tienen un tamaño apetecible. Conviene ir removiendo la tierra alrededor para ver su crecimiento. Conviene cosechar cuando empieza a asomar la raíz.

Asociaciones favorables

Acelga, ajo, berenjena, cebolla, col, guisante, judía, lechuga, patata, puerro, rábano y tomate.

Asociaciones desfavorables

Otras umbelíferas como el apio, hinojo y perejil.

Enfermedades y plagas

La larva de la mosca de la zanahoria ataca la raíz haciendo galerías en su interior. También suele verse afectada por plagas de pulgón.

Para obtener semillas

Para obtener semillas habrá que dejar que la planta eche la flor, de forma similar al proceso que se hace con las cebollas.